

### Схема приема варфарина с учетом суммарной недельной дозы (таблица 1)

Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота	Воскресенье	Недельная доза
2,5 мг	5 мг	2,5 мг	5 мг	2,5 мг	5 мг	5 мг	27,5 мг
2,5 мг	5 мг	5 мг	5 мг	2,5 мг	5 мг	5 мг	30 мг
2,5 мг	5 мг	5 мг	5 мг	5 мг	5 мг	5 мг	32,5 мг
5 мг	5 мг	5 мг	5 мг	5 мг	5 мг	5 мг	35 мг
7,5 мг	5 мг	5 мг	5 мг	5 мг	5 мг	5 мг	37,5 мг
7,5 мг	5 мг	5 мг	5 мг	7,5 мг	5 мг	5 мг	40 мг
7,5 мг	5 мг	7,5 мг	5 мг	7,5 мг	5 мг	5 мг	42,5 мг

Если пациенту показан прием варфарина с целью достижения среднего уровня гипокоагуляции. показателя МНО в 2,5 (2,0-3,0), следует придерживаться алгоритма, приведенного в таблице N 2

Алгоритм изменения дозы варфарина при среднем уровне гипокоагуляции. (Показатель МНО находится в пределах от 2,0 до 3,0 в среднем - 2,5)

таблица 2

МНО						
	<1.5	1.5-1.9	2.0-3.0	3.1-3.9	4.0-4.9	5.0-6.0
Изменение дозы	увеличение недельной дозы на 10-20%	увеличение недельной дозы на 5-10%	без изменений	снижение недельной дозы на 5-10%	пропустить 1 день и снизить недельную дозу на 10%	пропустить 1-2 дня и снизить недельную дозу на 5-15%
Контроль МНО через:	4-8 дней	7-14 дней	См. алгоритм наблюдения табл. 8	7-14 дней	4-7 дней	1-5 дней

Если же пациенту показан более высокий уровень гипокоагуляции, требующий достижения МНО в пределах 2.5-3,5 (в среднем 3,0), следует соблюдать алгоритм, приведенный в таблице N 3

Алгоритм изменения дозы варфарина при высоком уровне гипокоагуляции.  
(Показатель МНО находится в пределах от 2,5 до 3,5 в среднем - 3,5)

таблица 3

МНО					
	<1.5	1.5-2.4	2.5-3.5	3.6 – 4.5	4.6-6.0
Изменение дозы	увеличение недельной дозы на 10-20%	увеличение недельной дозы на 5-10%	без изменений	снижение недельной дозы на 5-10%	пропустить 1 день и снизить недельную дозу на 10%
Контроль МНО через:	4-8 дней	7-14 дней	См. алгоритм наблюдения табл. 8	7-14 дней	2-8 дней

После достижения необходимого уровня МНО алгоритм дальнейшего наблюдения должен быть следующим: первое определение МНО следует производить через 5-10 дней, второе - через 2 недели, третье - через 3 недели, четвертое и все последующие - через 4 недели.

Более частое определение МНО требуется в тех случаях, когда:

- наблюдаются нестабильные результаты;
- изменяется доза препарата;
- изменяется сопутствующая терапия;
- появляется кровоточивость (носовые, маточные кровотечения, кровоточивость десен, появление петехий, гематом, гематурия);
- присоединяется другая патология (острая пневмония, пиелонефрит и др.)